Лекарствие

Регистрационный номер: П N013560/02-010313

Торговое название: Релиф®

Международное непатентованное название (или группировочное название): Фенилэфрин

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав

в 1 суппозитории:

Действующее вещество:

- фенилэфрина гидрохлорид 5,00 мг

Вспомогательные вещества:

- масло печени акулы 60,00 мг,
- какао бобов масло 1710,00 мг,
- крахмал кукурузный 224,2 мг,
- метилпарагидроксибензоат 0,40 мг,
- пропилпарагидроксибензоат 0,40 мг.

Описание: непрозрачные суппозитории, от почти белого до светло-желтого цвета, в форме торпеды со слабым запахом рыбы.

Фармакотерапевтическая группа: средство лечения геморроя

Код АТХ: C05AX03

Фармакологические свойства: Фенилэфрина гидрохлорид является α-адреномиметиком, оказывает местное сосудосуживающее действие, что способствует уменьшению экссудации, отечности тканей и зуда в аноректальной области.

Показания к применению: п качестве симптоматического средства при геморрое, трещинах заднего прохода, анальном зуде.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, тромбоэмболическая болезнь, гранулоцитопения, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью: артериальная гипертензия, гипертиреоз, сахарный диабет, задержка мочи (гипертрофия предстательной железы), беременность, период лактации.

Способ применения и дозы: препарат следует применять после проведения гигиенических процедур.
Ректально по 1 суппозиторию утром, на ночь и после каждого опорожнения кишечника до 4 раз в сутки.

Побочное действие: редко - аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: из-за содержащегося фенилэфрина снижается действие гипотензивных лекарственных средств. При одновременном назначении с антидепрессантами — ингибиторами МАО возможно развитие гипертонического криза.

Особые указания: не рекомендуется применение у детей в возрасте до 12 лет, в период беременности и кормления грудью без согласования с врачом.
В случае кровотечения, ухудшения состояния или при отсутствии эффекта в течение 7 дней необходимо прекратить применение препарата и обратится за консультацией к врачу.
Не следует применять совместно с антигипертензивными лекарственными средствами и ингибиторами МАО.

Лекарствие

Форма выпуска: суппозитории ректальные 5 мг. По 6 суппозиториев помещают в блистер из непрозрачной поливинилхлоридной пленки. 2 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в картонную пачку.

Условия хранения: при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска: Без рецепта.

Производитель: ЗАО «Байер», Россия, произведено: Институт де Ангели С.р.Л., 50066 Регелло (Флоренция), Лок. Прулли, 103/С, Италия

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 107113 Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2 Тел.: (495) 231-12-00, факс (495) 231-12-02

Проект Лекарствие (lekarstvie.ru) желает Вам здоровья!