Лекарствие

**Регистрационный номер**: ЛС- 000499

**Торговое название:** Элтацин®.

**Владелец регистрационного удостоверения**: БИОТИКИ МНПК, ООО (Россия)

**Представительство**: БИОТИКИ МНПК ООО (Россия)

**Код АТХ**: C01EX (Прочие комбинированные препараты для лечения заболеваний сердца)

## Активные вещества

глицин (glycine) Rec.INN зарегистрированное ВОЗ

глутаминовая кислота (glutamic acid) Rec.INN зарегистрированное ВОЗ

цистин (cystine) Rec.INN зарегистрированное ВОЗ

**Форма выпуска, состав и упаковка**: Таблетки подъязычные круглые, двояковыпуклые, белого или белого с желтоватым оттенком цвета с элементами мраморности.

| Состав | **1 таб.** |
|---|---|
| глицин | 70 мг |
| L-глутаминовая кислота | 70 мг |
| L-цистин | 70 мг |

*Вспомогательные вещества*: метилцеллюлоза водорастворимая 7.8 мг, магния стеарат 2.2 мг.

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа**: Препарат, нормализующий метаболизм миокарда, уменьшающий гипоксию тканей

**Фармако-терапевтическая группа**: Антиоксидантное средство

## Фармакологическое действие

Антиоксидантный препарат. Элтацин® - комбинированный препарат, который содержит смесь заменимых аминокислот: глицина, глутаминовой кислоты и цистина, являющихся регуляторами обмена веществ: повышающих внутриклеточную концентрацию глутатиона и активность глутатионзависимых ферментов, нормализующих окислительно-восстановительные процессы и утилизацию кислорода в тканях, за счет чего препарат:

- проявляет антиоксидантное (уменьшая содержание свободных радикалов, перекисных соединений, малонового диальдегида) и антигипоксантное (повышая устойчивость организма к кислородной недостаточности, усиливая процессы синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ)) действие;
- повышает сократительную способность миокарда;
- увеличивает физическую работоспособность;
- улучшает качество жизни больных с хронической сердечной недостаточностью (повышая социальную адаптацию, улучшая психоэмоциональное состояние);
- ускоряет восстановление работоспособности после интенсивных физических нагрузок у детей.

Лекарствие

## Показания

- хроническая сердечная недостаточность I-III функционального класса по классификации NYHA у взрослых (на фоне стандартной терапии);
- хроническая сердечная недостаточность I-II функционального класса по классификации NYHA у детей в возрасте от 12 до 18 лет (на фоне стандартной терапии);
- синдром вегетативной дисфункции у детей в возрасте от 12 до 18 лет;

профилактика хронического физического перенапряжения и восстановление после интенсивных физических нагрузок при занятии спортом у детей в возрасте от 11 до 15 лет.

## Режим дозирования

Подъязычно. Таблетку можно также разжевать и подержать во рту под языком до полного растворения.

*Хроническая сердечная недостаточность I-III функционального класса по классификации NYHA* у **взрослых**: по 1 таб. 3 раза/сут подъязычно, курс лечения от 1 до 3 месяцев в зависимости от тяжести заболевания, повторные курсы назначаются по рекомендации врача.

*Хроническая сердечная недостаточность I-II функционального класса по классификации NYHA* у **детей в возрасте от 12 до 18 лет**: по 1 таб. 3 раза/сут подъязычно, курс лечения от 1 до 3 месяцев в зависимости от тяжести заболевания, повторные курсы назначаются по рекомендации врача.

*Синдром вегетативной дисфункции* у детей в возрасте от 12 до 18 лет: по 1 таб. 3 раза/сут подъязычно, курс лечения от 1 до 3 месяцев в зависимости от тяжести заболевания, повторные курсы назначаются по рекомендации врача.

*Профилактика хронического физического перенапряжения* у детей в возрасте от 11 до 15 лет: по 1 таб. 2 раза/сут в течение 2-3 недель.

В *период восстановления после интенсивных физических нагрузок при занятии спортом* у детей в возрасте от 11 до 15 лет – по 1 таб. 3 раза/сут в течение 2 недель.

**Побочное действие**: Возможны аллергические реакции.

**Противопоказания к применению**: повышенная чувствительность к препарату; детский возраст до 11 лет (эффективность и безопасность не установлены).

**Применение при беременности и кормлении грудью**: Клинических исследований применения препарата у беременных и в период лактации не проводилось. Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

**Применение у детей**: Противопоказание: детский возраст до 11 лет (эффективность и безопасность не установлены).

**Особые указания**: Можно принимать одновременно с ингибиторами АПФ, бета-адреноблокаторами, диуретическими средствами, антагонистами альдостерона, органическими нитратами и блокаторами "медленных" кальциевых каналов.

**Передозировка**: Нет данных.

**Лекарственное взаимодействие**: Нет сведений.

**Условия и сроки хранен**ия: Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности - 3 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

Лекарствие

**Условия отпуска из аптек**: Препарат отпускается без рецепта.

*Проект Лекарствие (lekarstvie.ru) желает Вам здоровья!*