Регистрационный номер: ЛС-002173

Торговое название препарата: Пилобакт®

**Лекарственная форма**: набор таблеток и капсул (кларитромицин - таблетки покрытые пленочной оболочкой, амоксициллин - капсулы, омепразол - капсулы кишечнорастворимые).

Фармакотерапевтическая группа: средство лечения пептической язвы.

## Фармакологические свойства

Тройная терапия, включающая омепразол, кларитромицин и амоксициллин позволяет достичь высокий процент эрадикации Helicobacter pylori (85-94%). Омепразол угнетает секрецию желудочной кислоты за счет специфического ин-гибирования H+ K+-ATФазы - фермента, находящегося в мембранах париетальных клеток слизистой оболочки желудка. Снижает базальную и стимулированную секрецию независимо от природы раздражителя. После однократного приема препарата внутрь действие омепразола наступает в течение первого часа и продолжается в течение 24 часов, максимум эффекта достигается через 2 часа. После прекращения приема препарата секреторная активность полностью восстанавливается через 3-5 суток. Кларитромицин - антибиотик из группы макролидов, полусинтетическое производное эритромицина А.


Оказывает противомикробное действие, которое связано с подавлением синтеза белка путем взаимодействия с 50S рибосомальной субъединицей микробной клетки. Эффективен в отношении большого числа грамположительных, грамотрицательных аэробных и анаэробных микроорганизмов, включая H,Py1ori. Образующийся в организме метаболит 14-гидроксикларитромицин также обладает выраженной противомикробной активностью. Амоксициллин полусинтетический пенициллин, обладает бактерицидным действием, имеет широкий спектр действия. Противомикробное действие связано с ингибированием синтеза пептидогликана (опорного полимера клеточной стенки) в период деления и роста. Обладает выраженной активностью по отношению к H.Pylori. Резистентность H.Py1ori к амоксициллину проявляется редко. Комбинация амоксициллина и кларитромицина обладает потенцированным антимикробным эффектом по отношению к H.Pylori.

**Показания к применению**: Эрадикационная терапия H. Pylori при язвенной болезни 12-типерстной кишки.

## Противопоказания

- Повышенная чувствительность к омепразолу, кларитромицину или амоксициллину, а также к антибиотикам группы макролидов;
- Запрещается сочетанное применение с цизапридом, пимозидом, астемизолом и терфенадином (см. раздел "Взаимодействие с другими лекарственными средствами");
- Беременность;
- Период лактации;
- Порфирия;
- Детский возраст;
- Почечная и/или печеночная недостаточность.

Способ применения и дозы: Каждый набор Пилобакта АМ содержит две капсулы омепразола (20 мг), две таблетки кларитромицина (500 мг) и четыре капсулы амоксициллина (500 мг) и рассчитан на один день лечения. Принимать внутрь по одной капсуле омепразола, одной таблетке кларитромина и две капсулы амоксициллина два раза в сутки перед едой



## Побочные эффекты

Со стороны органов пищеварения: дисбактериоз, диарея или запор, тошнота, рвота, метеоризм, боль в животе, сухость во рту, нарушения вкуса, стоматит, транзиторное повышение активности"печеночных" ферментов в плазме, нарушение функции печени, редко - псевдомембранозный энтероколит.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, возбуждение, сонливость, бессонница, атаксия, парестезии, депрессия, спутанность сознания, галлюцинации, эпилептические реакции, периферическая невропатия.

Со стороны опорно-двигательного аппарата: мышечная слабость, миалгия, артралгия.

Со стороны системы кроветворения: лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура, анемия.

Со стороны кожных покровов: зуд; редко - кожная сыпь, в отдельных случаях фотосенсибилизация, мультиформная экссудативная эритема, алопеция.

*Аллергические реакции:* крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм и анафилактический шок.

*Прочие:* тахикардия, интерстициальный нефрит, нарушение зрения, периферические отеки, усиление потоотделения, лихорадка, гинекомастия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Одновременное назначение теофиллина и кларитромицина сопровождается повышением концентрации теофиллина. Одновременное назначение кларитромицина с терфенадином повышает концентрацию последнего и может привести к удлинению интервала QT. Одновременное назначение кларитромицина с непрямыми антикоагулянтами может потенцировать действие последних. При одновременном назначении с кларитромицином уровни карбамазепина, циклоспорина, фенитоина, дизопирамида, ловастатина, вальпроата, цизаприда, пимозида, астемизола, дигоксина могут быть повышены. Омепразол может замедлять элиминацию фенитоина, диазепама, варфарина, а также влиять на абсорбцию кетоконазола, ампициллина и солей железа за счет ингибирования секреции кислоты в желудке. При одновременном назначение амоксициллина с пероральными контрацептивами возможно снижение эффекта последних.

## Особые указания

Перед началом терапии необходимо исключить наличие злокачественного процесса (особенно при язве желудка), т. к. лечение, маскируя симптоматику, может отсрочить постановку правильного диагноза.

С осторожностью назначают на фоне приема лекарственных средств, метаболизирующихся печенью. В случае совместного назначения с варфарином или другими непрямыми антикоагулянтами необходимо контролировать протромбиновое время.

При заболеваниях сердца в анамнезе не рекомендуется одновременный прием с терфенадином, цизапридом, астемизолом. Форма выпуска

Таблеток и капсул набор (кларитромицин - таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг, амоксициллин - капсулы 500 мг, омепразол - капсулы кишечнорастворимые 20 мг): по 2 таблетки кларитромицина, 4 капсулы амоксициллина, 2 капсулы омепразола в одной контурной безъячейковой упаковке из алюминиевой фольги (стрип). Семь стрипов в картонной пачке с инструкцией по применению.



**Условия хранения**: Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: По рецепту.

Более подробную информацию смотрите в инструкции ПИЛОВАКРАМ. За дополнительной информацией просьба обращаться в представительство компании "Ранбакси Лабораториз Лтд." в Москве: Литература

- 1. P.Malfertheiner, F.Megraud, C.O.Morain. Guidelines for the management of H.pylori infection. Summary of the Maastricht-3 2005 Consensuns report. Business biefing; European gastroenterology review 2005.
- 2. Фармаатека №6 (141) 2007, МААСТРИХТ 2 ,3 , Н.М. Хомерики.
- 3. По С.И.Пиманов, С.А.Попов, Е.В.Макаренко. Consilium medicum, Tom 05/N 7/ 2003. Метанализ эффективности эрадикационной терапии Helicobacter pylori по протоколу "омепразол-кларитромицин-амоксициллин".
- 4. Отчет о клиническом испытании препарата ПИЛОБАКТ АМ, УНЦ МЦ, Управления делами Президента РФ. Заведующий кафедрой гастроэнтерологии проф. О.Н. Минушкин. 129223, Москва, пр.Мира, ВВЦ, ДЦ "Технопарк", офис 45-48. Тел.: (495) 234-56-12/13

Проект Лекарствие (lekarstvie.ru) желает Вам здоровья!