

Регистрационный номер: П N008856/01-270312

Торговое название: ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ®

МНН или группировочное название: Трибенозид+лидокаин

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав

1 суппозиторий содержит

Активные вещества: трибенозид 400,00 мг, лидокаин основание 40,00 мг.

Вспомогательные вещества: суппозиторная масса n ° 1 (Витепсол E85) 305,00 мг, суппозиторная масса n ° 2 (Витепсол W35) 1255,00 мг.

Описание: Твердые ректальные суппозитории торпедообразной формы, без трещин, слегка жирные на ощупь, желтовато-белого цвета, со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: средство лечения геморроя.

Код АТХ: C05AX03.

Фармакологические свойства

Комбинированное противогеморроидальное средство. Трибенозид уменьшает проницаемость капилляров и улучшает сосудистый тонус; антагонистически воздействует на некоторые эндогенные вещества, выполняющие роль медиаторов при развитии воспаления и боли. Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие. Препарат вызывает быстрое ослабление симптомов, вызванных геморроем (боль, зуд и натяжение кожи).

Фармакокинетика. Системная биодоступность трибенозида, поступающего из суппозитория, достигает 30 % от количества, которое абсорбируется при приеме препарата внутрь (в виде капсул). Достижение максимальной концентрации в плазме, составляющей 1 мкг/мл (трибенозид+метаболиты), наблюдается через 2 часа после ректального введения 1 суппозитория (400 мг трибенозида). Трибенозид в значительной степени метаболизируется в печени. 20-27 % введенной дозы выделяется с мочой в виде метаболитов.

Показания к применению: Геморрой (внутренний и наружный).

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, печеночная недостаточность, беременность (I триместр).

Применение в период беременности и лактации: Необходимо учитывать возможный риск для плода или ребенка во время беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы: Ректально. При выраженных клинических симптомах вводят по 1 суппозиторию утром и вечером. При регрессии острых симптомов - по 1 суппозиторию 1 раз в сутки.

Побочное действие

Со стороны иммунной системы:

Очень редко (*Со стороны кожи и подкожных тканей:*

Редко (>1/10 000, **Передозировка**)

Случаи передозировки препарата не зарегистрированы.

При случайном приеме внутрь рекомендуется промывание желудочно-кишечного тракта, а также симптоматическая поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Случаи взаимодействия не зарегистрированы.

Особые указания: Если имеющиеся симптомы заболевания не уменьшаются в процессе лечения или отмечается появление новых необычных ощущений, следует обратиться к врачу.

При применении Прокто-Гливенол необходимо следить за гигиеной анальной области, избегать чрезмерного напряжения, принимать меры для поддержания мягкой консистенции стула.

Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами: В дозировках, не превышающих рекомендуемые, препарат не оказывает влияния на способность выполнения работы, связанной с необходимостью концентрации внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

Форма выпуска: Суппозитории ректальные. По 5 суппозитория в стрипе из комбинированного материала (полиэтилен/ полипропилен/алюминиевая фольга). 2 стрипа вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения: При температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. Не применять после даты истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения: Рекордати Ирландия Лтд., Рахинз Ист, Рингаскидди, Ко. Корк, Ирландия

Производитель: Делфарм Унинж САС, 26 рю де ла Шапель, 68330 Унинж, Франция.

Все претензии по качеству препарата направлять: Россия, 123610 Москва, Краснопресненская наб.12, ЦМТ, «Международная-2»

Проект Лекарствие (lekarstvie.ru) желает Вам здоровья!