

## Афлубин капли

Инструкция (информация для специалистов) по медицинскому применению препарата Афлубин

**Регистрационный номер:** П№13116/01

**Торговое название препарата:** Афлубин® / Aflubin®

**Лекарственная форма:** капли для приема внутрь гомеопатические

### Состав

В 100 мл препарата содержится:

**активные компоненты:** Gentiana (Генциана) D1 1 мл, Aconitum (Аконитум) D6 10 мл, Bryonia (Бриония) D6 10 мл, Ferrum phosphoricum (Феррум фосфорикум) D12 10 мл, Acidum sarcosolacticum (Ацидум сарколактикум) D12 10 мл;

**вспомогательные компоненты:** спирт этиловый (этанол) 43 % (по массе) 59 мл.

**Описание:** прозрачная от бесцветной до бесцветной со слегка желтоватым оттенком жидкость без специфического запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** гомеопатическое лекарственное средство.

### Показания к применению

В комплексном лечении гриппа, парагриппозных и острых респираторных заболеваний с целью облегчения симптомов указанных заболеваний, а также для их профилактики как плановой, так и экстренной; при лечении воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Детский возраст до 1 года.

**С осторожностью:** заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** при беременности и в период грудного вскармливания применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

**Способ применения и дозы:** для обеспечения наибольшей эффективности Афлубин® следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи.

Возраст	Доза (разовая)	Кратность приема	Способ применения
1 - 2 день заболевания ОРЗ или гриппом			
Взрослые и подростки	10 капель	От 3 до 8 раз в день (не более)	Внутри в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети от 1 года до 12 лет	5 капель		
Дальнейшее лечение клинических проявлений ОРЗ или гриппа			
Взрослые и подростки	10 капель	3 раза в день. 5-10 дней	Внутри в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или

Дети от 1 года до 12 лет	5 капель		через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Плановая профилактика обострения заболевания в начале холодного времени года или перед эпидемией гриппа			
Взрослые и подростки	10 капель	2 раза в день. 3 недели	Внутри в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети от 1 года до 12 лет	5 капель		
Экстренная профилактика – проводится сразу же после контакта с заболевшим гриппом или ОРЗ или после сильного переохлаждения			
Взрослые и подростки	10 капель	2 раза в день. 2 дня	Внутри в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети от 1 года до 12 лет	5 капель		
Лечение воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом			
Взрослые и подростки	10 капель	3-8 раз в день в начале лечения (1-2 день), дальнейшее лечение 3 раза в день в течение 1 месяца	Внутри в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети от 1 года до 12 лет	5 капель		

В начале заболевания, а также случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата по 8-10 капель каждые полчаса – час до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

**Побочное действие:** возможны аллергические реакции. Редко может отмечаться повышенное слюноотделение. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

**Передозировка:** случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат не должен применяться пациентами с алкогольной зависимостью. Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

**Особые указания:** поскольку препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

**Влияние на способность управлять механизмами и автомобилем:** в период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций ( управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

В состав препарата входит спирт этиловый (этанол) - 43% по массе. Афлубина (Aflubina) - капли содержит в разовой дозе (10 капель) 0,17 спирта этилового (этанола). В максимальной суточной дозе (8 раз в день по 10 капель) содержится 1,35 г этилового спирта (этанола).

**Форма выпуска:** Капли гомеопатические. По 20 или 50 мл во флаконы из коричневого стекла (тип III) с навинчивающейся крышкой из пропилена с контролем первого вскрытия, с капельницей из полиэтилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения:** В оригинальной упаковке и защищенном от сильных электромагнитных полей месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

**Производитель:** Рихард Биттнер АГ

*Юридический адрес:* Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия

*Адрес места производства:* Оссиахерштрассе 7, А-9560 Фельдкирхен, Австрия.

**Организация, принимающая претензии потребителей:** ООО «Биттнер Фарма» 127018, Москва, ул. Суцьевский вал, д. 18

*Проект Лекарствие ([lekarstvie.ru](http://lekarstvie.ru)) желает Вам здоровья!*