

**Регистрационный номер:** П N011382/01 от 19.01.2006

**Торговое название:** Проспан®

**Лекарственная форма:** сироп

**Состав: 1 мл препарата содержит:**

**Действующее вещество:** сухой экстракт листьев плюща (5-7.5:1) 7,00 мг

*Другие компоненты:*

очищенная вода 566,66 мг

калия сорбат 1,34 мг

лимонная кислота безводная 0,50 мг

раствор сорбитола (кристаллизованный) 550,00 мг

камедь ксантана 1,50 мг

вишневый аромат 3,00 мг

**Описание:** Светло-коричневый, слегка мутноватый сироп с запахом вишни.

**Фармакотерапевтическая группа:** Отхаркивающее средство растительного происхождения.

**Фармакологическое действие:** Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и спазмолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

**Показания к применению:** В качестве отхаркивающего средства в терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью: непереносимость фруктозы (применение возможно только под контролем врача).

**Применение во время беременности и кормления грудью:** Применение препарата в периоды беременности и кормления грудью возможно по назначению врача.

## **Способ применения и дозы**

Внутри грудным детям (0-1 год) по 2,5 мл 2 раза в день.

Маленьким детям (1-6 лет) по 2,5 мл 3 раза в день.

Детям школьного возраста и подросткам по 5 мл 3 раза в день.

Взрослым по 5-7,5 мл 3 раза в день.

Дозирование препарата производится с помощью мерного стаканчика. Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю.

Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу.

**Побочные действия:** Возможны аллергические реакции. Очень редко при применении препарата может наблюдаться слабительный эффект (вследствие содержания сорбитола).

**Передозировка:** Прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

**Особые указания:** Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей. В процессе хранения возможно легкое помутнение сиропа и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.

Перед употреблением взбалтывать!

**Форма выпуска:** Сироп; по 100 мл или 200 мл во флаконы темного стекла с полиэтиленовой пробкой-дозатором, навинчиваемой крышкой и мерным колпачком.

**Условия хранения:** При температуре не выше +25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей!

**Срок годности:** 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:** Без рецепта.

**Производитель:** Энгельхард Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ Херцбергштрассе 3 Д-61138 Нидердорфельден Германия.

*Проект Лекарствие ([lekarstvie.ru](http://lekarstvie.ru)) желает Вам здоровья!*