Лекарствие

Инфлюцид

Инструкция (информация для специалистов) по медицинскому применению гомеопатического препарата Инфлюцид (Influcid®)

Торговое название: Инфлюцид (Influcid®)

Форма выпуска, состав и упаковка: *Таблетки для рассасывания* от белого до слегка бело-желтого цвета, круглые, плоские, со скошенной кромкой.

Состав	1 таб.
Aconitum D3	25 мг
Gelsemium D3	25 мг
Ipecacuanha D3	25 мг
Phosphorus D5	25 мг
Bryonia D2	25 мг
Eupatorium perfoliatum D1	25 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

20 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакологическое действие: Гомеопатический препарат, применяемый при простудных заболеваниях. Оказывает противовоспалительное, жаропонижающее, отхаркивающее и муколитическое действие. Способствует укреплению иммунитета.

Фармакокинетика: Фармакокинетика препарата Инфлюцид не изучена.

Показания: профилактика и лечение гриппа и других ОРВИ.

Режим дозирования

При *остром заболевании* детям от 3 до 6 лет назначают по 1 таб. каждые 2 ч (не более 6 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1/2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

Детям от 6 до 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 7-8 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1-2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

Препарат в форме раствора для приема внутрь при *острых заболеваниях* назначают по 10 капель каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 10-20 капель 3 раза/сут до полного выздоровления.

Для *профилактики ОРВИ* детям от 3 до 6 лет назначают по 1/2 таб. 2 раза/сут; детям от 6 до 12 лет - по 1 таб. 2 раза/сут; взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут.

Для *профилактики ОРВИ* препарат в форме раствора для приема внутрь назначают взрослым и детям старше 12 лет по 10-20 капель 3 раза/сут.

Препарат следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи. Таблетки следует медленно рассасывать во рту. Детям от 3 до 5 лет рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде под язык.

Лекарствие

Побочное действие: возможны аллергические реакции.

Противопоказания к применению: повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не рекомендуется назначать препарат в форме таблеток детям в возрасте до 3 лет (из-за недостаточности клинических данных).

Применение при беременности и кормлении грудью: Применение препарата Инфлюцид при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Применение у детей

Не рекомендуется назначать препарат в форме таблеток детям в возрасте до 3 лет (из-за недостаточности клинических данных).

При *остром заболевании* детям от 3 до 6 лет назначают по 1 таб. каждые 2 ч (не более 6 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1/2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

Детям от 6 до 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 7-8 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1-2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.

Для *профилактики ОРВИ* детям от 3 до 6 лет назначают по 1/2 таб. 2 раза/сут; детям от 6 до 12 лет - по 1 таб. 2 раза/сут; детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут.

Для *профилактики ОРВИ* препарат в форме раствора для приема внутрь назначают детям старше 12 лет по 10-20 капель 3 раза/сут.

Особые указания

При применении Инфлюцида возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При применении Инфлюцида допускается использование других лекарственных препаратов.

Пациент должен быть информирован, что в случае отсутствия улучшения при остром заболевании через 2 дня, препарат следует отменить и проконсультироваться с врачом.

Прием препарата Инфлюцид в форме таблеток может оказывать отрицательное влияние на пациентов с целиакией и непереносимостью лактозы. Таким пациентам рекомендуется принимать препарат в форме раствора для приема внутрь.

Передозировка: В настоящее время о случаях передозировки препарата Инфлюцид не сообщалось.

Лекарственное взаимодействие: Лекарственное взаимодействие препарата Инфлюцид с другими лекарственными средствами не установлено.

Условия и сроки хранения: Препарат в форме таблеток следует хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре 15°-25°С.

Препарат в форме раствора для приема внутрь следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при комнатной температуре.

Срок годности препарата в форме таблеток - 3 года, в форме раствора для приема внутрь - 5 лет.

Условия отпуска из аптек: Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Лекарствие

Проект Лекарствие (lekarstvie.ru) желает Вам здоровья!